

# MURIBROM BRODIFACOU M FRESH BAIT

## MOMEALĂ PROASPĂTĂ RATICIDĂ



### DĂUNĂTORI ȚINTĂ



**ȘOBOLAN GRI**  
(*Rattus norvegicus*)



**ȘOBOLAN NEGRU**  
(*Rattus rattus*)



**ȘOARECE DE CASA**  
(*Mus musculus domesticus*)

### CARACTERISTICI TEHNICE

#### Compoziție:

- Brodifacoum: 0,005 %;
- Bitrex(substanța gust amar): 0,001%;
- Excipienți: 100 %.

### DESCRIERE

**Raticid-ul Muribrom Brodifacoum Fresh Bait** este o otravă pentru rozătoare cu acțiune rapidă și eficientă împotriva șoarecilor, sobolanilor și tuturor tipurilor de rozătoare de talia celor de mai sus. Este un rodenticid gata de utilizare bazat pe o substanță anticoagulantă cunoscută ca Brodifacoum, eficientă împotriva șoarecilor și sobolanilor după o singură ingerare. Formula constă într-o pastă proaspătă de culoare albastră, în mod particular atractivă și gustoasă pentru toate tipurile de rozătoare menționate în prezenta instrucțiune. Conține un agent de gust amar (Bitrex) pentru a preveni ingerarea accidentală de către copii.

### MOD DE UTILIZARE

Amplasati momelile în apropierea vizuinelor și a zonelor de tranzit ale rozătoarelor, ferite de umezeala, căldura și departe de accesul animalelor domestice și al copiilor. În canale se pot utiliza fără suportul momelii cu condiția ca momelile să fie expuse.

### Instrucțiuni și doze de utilizare:

#### Pentru utilizatori non-profesionali:

Muribrom Brodifacoum Fresh Bait poate fi utilizat în interiorul și împrejurul clădirilor civile și industriale (inclusiv depozite și compartimente de marfă), pivnite, garaje, spații închise și grădini private, ferme și locuințe. Nu se utilizează în zone cultivate. Produsul este conținut în pachete: de 40-60-100-160-200-260-500g (conțin raticid momeala în pasta proaspătă, greutate 20g fiecare, în pungi de hartie alimentară). Produsul este folosit în case, pivnite, garaje, dulapuri și grădini private. Nu se utilizează în zone cultivate.

Produsul este gata de utilizare și trebuie folosit conform dozelor indicate mai jos. Evitați atingerea produsului cu mâinile, folosiți mănuși de protecție. Pachetele din interior trebuie manipulate cu grijă și depozitate, așa cum sunt, în cutia de momeala conform dozelor indicate mai jos. Momelile raticide trebuie amplasate în cutii adecvate pentru momeala, inviolabile și marcate, disponibile pe piață. Observați zona infestată și plasați cutia cu momeala în cuiburile rozătoarelor, pe rutele lor și locurile cu prezență crescută. Cutiile cu momeala trebuie amplasate la 5-10 m distanță una față de alta

**Doze recomandate:**

Soarece de casa: 2 momeli (40 g) x 100 m<sup>2</sup>

Sobolani gri: 3-5 momeli (60-100g) x 100 m<sup>2</sup>

Sobolan negru: 3-5 momeli (60-100 g) x 100 m<sup>2</sup>

Verificati saptamanal recipientele cu momeli și înlocuiti-le pe cele roase. Cautati și eliminați rozatoarele moarte la intervale frecvente de timp și eliminați-le conform normelor în vigoare.

Produsul nu este destinat pentru uz permanent; efectuați tratamente de pana la 6 saptamani

La sfarsitul tratamentului, eliminați cutiile cu momeala ramase conform normelor in vigoare. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe eticheta.

**Pentru uz profesional:**

Produsul este conținut în pachete: de 1-3-5-10-20-25g (contin raticid momeala in pasta proaspata, greutate 20g fiecare, în pungi de hartie alimentara). Produsul poate fi utilizat în interiorul și împrejurul cladirilor civile si industrial (inclusive depozite si compartimente de marfa), pivnite, garaje, spații închise și gradini private, ferme si locuinte. Nu se utilizează în zone cultivate.

Produsul este gata de utilizare și trebuie folosit conform dozelor indicate mai jos. Evitați atingerea produsului cu mainile, folosiți mănuși de protecție. Pachetele din interior trebuie manipulate cu grija și depozitate, așa cum sunt, în cutia de momeala conform dozelor indicate mai jos. Momelile raticide trebuie amplasate în cutii adecvate pentru momeala, inviolabile și marcate, disponibile pe piata. Observati zona infestata si plasati cutia cu momeala in cuiburile rozatoarelor, pe rutele lor și locurile cu prezenta crescută.

**Doze recomandate:**

Soarece de casa: 2 momeli (40 g) x 100 m<sup>2</sup>

Sobolani gri: 3-5 momeli (60-100 g) x 100 m<sup>2</sup>

Sobolan negru: 3-5 momeli (60-100 g) x 100 m<sup>2</sup>

Verificati saptamanal recipientele cu momeli și înlocuiti-le pe cele roase. Cautati și eliminați rozatoarele moarte la intervale frecvente de timp și eliminați-le conform normelor în vigoare.

Produsul nu este destinat pentru uz permanent; efectuați tratamente de pana la 6 saptamani

La sfarsitul tratamentului, eliminați cutiile cu momeala ramase conform normelor in vigoare. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe eticheta.

**Precauții:**

-P101, dacă este nevoie de consultarea unui medic ca urmare a folosirii produsului, prezentați medicului ambalajul;

-P102A, a nu se lăsa la îndemana copiilor;

-P270A, a nu se consuma alimente, băuturi, sau a nu se fuma pe durata utilizării;

-P280, purtați mănuși, îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție, mască de protecție;

-P301/P310, în caz de ingerare sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic;

-P234, a se păstra numai în recipientul original.

**Măsuri pentru protecția mediului:**

Restricții pentru utilizarea produsului biocid:

În sistemul de canalizare se va aplica numai profesional, evitându-se contactul produsului cu animalele nețintă, sau pierderile necontrolate.

Măsuri în caz de dispersie accidentală:

Pe baza informațiilor disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor. Cu toate acestea trebuie evitată cât mai mult expunerea solului la produsul formulat precum și evitarea pătrunderii în sol, ținând cont de imobilitatea în sol a brodifacumului. În cazul pierderilor pe sol acestea se vor colecta. Dacă se constată pierderi majore se vor informa autoritățile.

Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

În cazul deversărilor în apă, se vor colecta în cel mai scurt timp, pierderile de produs.

Metode de decontaminare:

Stațiile și punctele de momeala sunt controlate, la un interval de 3-4 zile iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiți mănuși de protecție.

În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei.

În utilizarea profesionista, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curățate înainte de eliminare.

### **Măsuri pentru protecția animalelor și a hranei pentru animale:**

Cutiile trebuie să fie securizate corect pentru ca momeala să nu poată fi tarată de rozătoare sau de animale care nu sunt specii tinta. Nu se va folosi pe terenuri agricole cultivate.

Capcanele cu momeala trebuie să fie plasate în condiții de siguranță și situate în zone care sunt inaccesibile pentru animalele de companie sau alte animale nevizate.

Inspecții periodice ale capcanelor cu momeala trebuie efectuate (acest lucru este recomandat la fiecare 3-4 zile) și înlocuite momelile care au fost consumate de către rozătoare sau au fost afectate de apă sau sunt contaminate cu murdărie.

Ambalajele goale, rozătoarele moarte, resturi de momeala și capcanele, trebuie să fie depozitate la punctele de colectare, sau la locurile stabilite de către autoritatea locală, în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a reduce la minimum riscul de otrăvire secundară, trebuie să se facă verificarea locurilor în care a fost pusă momeala să se colecteze și să se depoziteze rozătoarele moarte conform cu legislația în vigoare.

Pentru a reduce la minimum problemele de rezistență și riscul de intoxicație primară, produsul nu poate fi folosit permanent ca momeala (durata unui tratament va fi de maxim 6 săptămâni). Nu trebuie aplicat în zonele în care se afla alimente/furaje, ustensile de gătit, suprafețe de procesare a alimentelor ce pot intra în contact cu produsul sau pot fi contaminate de acesta.

### **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță pentru produsul biocid:**

Momelile se vor îndepărta după încheierea tratamentului, urmând să fie eliminate conform legislației în vigoare. Eliminarea momelilor și a cadavrelor de rozătoare se face prin incinerare, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori autorizați.

Ambalaj:

Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.

### **Condiții de depozitare:**

Produsul se va păstra în ambalajul original, bine închis, ferit de lumină într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat. Produsul se va păstra în recipiente bine închise în locuri ventilate și răcoroase departe de razele solare directe, în locuri sigure, inaccesibile animalelor de companie și a altor animale care nu sunt specii țintă, pentru a minimiza riscul de atingere sau ingerare.

### **Măsuri de prim ajutor:**

În caz de inhalare: îndepărtați persoana afectată din zona contaminată, transportați la aer liber și cereți sfatul medicului.

În caz de contact cu pielea: spălați pielea contaminată cu săpun și multă apă.

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

În caz de contact cu ochii: spălați ochii 15-20 min. cu apă curgătoare, ținând pleoapele complet deschise. Cereți imediat sfatul medicului.

În caz de ingestie: în caz de ingestie recentă (<3h), și persoană conștientă provocați vărsături, spălați gura cu multă apă, administrați cărbune activ. Cereți imediat sfatul medicului, și arătați recipientul și eticheta. Urmați protocolul medical adecvat conform indicațiilor Centrului toxicologic.

Antidot: vitamina K1 - sub supraveghere medicală.

### **Informații adiționale:**

Expunerea dermală, inhalatorie și orală pentru operatori profesioniști și non-profesioniști se consideră acceptabilă dacă se respectă instrucțiunile de utilizare prezentate pe eticheta produsului.

Termenul de valabilitate a produselor biocide în condiții normale de depozitare : 24 luni.

#### **AMBALARE**

<b>COD</b>	<b>PRODUS</b>	<b>AMBALARE</b>
RO00016	MURIBROM BRODIFACOUM FRESH BAIT	15KG